

S -ParvAb (4156)**Sisältää osatutkimukset:**

S -ParvAbG, KL 4249

S -ParvAbM, KL 4250

Kaikista näytteistä tutkitaan IgG-ja IgM-luokan vasta-aineet.

Positiiviset tulokset voidaan tarvittaessa varmistaa immunoblot-menetelmällä, joista laskutetaan erikseen:

S-ParvAbJt (IgG), nro 12094

S-ParvAbJt (IgM), nro 12095

Indikaatiot Parvorokkovirusinfektion diagnosointi tai immuniteettitutkimus.**Näyte** 1-2 ml seerumia heti infektion alkuvaiheessa; tarvittaessa parinäyte n. 2 viikon kuluttua.**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunoluminometrinen (CLIA)**Toimitusaika** 3-6 työpäivää**Viitearvot** IgM: indeksi
IgG: yksikkö IE/ml**Tulkinta** Parvorokkovirusinfektion oireita ovat ihottuma, artriitti ja erythema infektiosum ("fifth disease"). Parvorokkovirusinfektioon voi liittyä myös anemia (ns. aplastinen kriisi). Positiivinen IgG-tulos ja negatiivinen IgM-tulos oireettomalla potilaalla viittaavat immuniteettiin parvorokkoa vastaan. Positiivinen IgM-tulos tai IgG:n voimakas nousu parinäytteiden välillä viittaavat tuoreeseen parvorokkovirusinfektioon. Tutkimuksesta annetaan lausunto.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi