

S -PsoIAb (2459)**Indikaatiot** Autoimmuunigastriitin ja pernisiöösin anemian selvittely.**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)**Toimitusaika** 3-5 työpäivää**Viitearvot** Alle 20 U/ml

Tulkinta Parietaalisolu-vasta-aineiden pääantigeeni on H/K-ATP-aasi ja niitä esiintyy valtaosalla autoimmuunista gastriittia ja pernisiöösiä anemioita sairastavista potilaista (n. 90%). Vasta-aineita voi muodostua myös muiden autoimmuunitautien yhteydessä, kuten mm. autoimmuuniperäisissä kilpirauhastauoissa, Addisonin taudissa ja tyypin 1:n diabeteksessä. Negatiivinen tulos ei välttämättä sulje pois pernisiöösin anemian mahdollisuutta. Gastriitin osalta seulomattomassa normaaliväestössä vasta-aineiden esiintyvyys on vain 6 - 13% luokkaa ja esiintyvyys kasvaa iän myötä.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen