

S -ICTP (3966)**Indikaatiot** Luun ja luuston kollageenin hajoaminen, osteolyttiset prosessit**Näyte Esivalmistelut:**

Verinäyte tulisi ottaa aamulla (klo 8-10) vuorokausivaihtelun vuoksi.

Näyte:

1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä viimeistään seuraavana päivänä. Muutoin kylmälähetys. Näyte säilyy kylmässä 5 vrk, jonka jälkeen näyte on pakastettava.**Menetelmä** Radioimmunologinen**Toimitusaika** 10 työpäivää

Viitearvot	alle 3 kk:	51-71	µg/l
	3-5 kk:	23-40	µg/l
	6-11 kk:	15-30	µg/l
	12-23 kk:	12-20	µg/l
	2-8 v:	7-16	µg/l
	pojat 9-12 v:	8-15	µg/l
	tytöt 9-10 v:	9-15	µg/l
	pojat 13-15 v:	10-23	µg/l
	tytöt 11-13 v:	10-16	µg/l
	pojat 16-18 v:	8-11	µg/l
	tytöt 14-15 v:	6-14	µg/l
	tytöt 16-18 v:	4-7	µg/l
	miehet yli 18 v:	2.1 - 5	µg/l
	naiset yli 18 v:	2.1 - 5.6	µg/l

Alihankinta Kyllä.**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi